

くすりのしおり

注射剤

2018年04月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ジゴシン注 0.25mg

主成分：ジゴキシン (Digoxin)

剤形：注射剤

シート記載：



この薬の作用と効果について

心臓に直接働いて心臓の筋肉の収縮力を強くしたり、速くなりすぎた脈を調節します。

通常、心不全および各種頻脈の予防と治療、うっ血性心不全、心房細動・粗動による頻脈、発作性上室性頻拍の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。房室ブロック、洞房ブロック、ジギタリス中毒、閉塞性心筋疾患、急性心筋梗塞、心室性期外収縮、心膜炎、肺性心、WPW症候群、電解質異常（低カリウム血症、高カルシウム血症、低マグネシウム血症など）、腎疾患、血液透析を受けている、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・成人：通常、静脈内に注射します。急速飽和療法を行うときは、2～4時間ごとに注射します。
- ・小児：通常、静脈内または筋肉内に注射します。急速飽和療法を行うときは、1日3～4回注射します。
- ・効果発現量と中毒量が近い薬です。血液中の薬の濃度を測定し、その結果にもとづいて使用期間と使用量を加減していきます。

生活上の注意

- ・アルコールが含まれていますので、アルコールに特に敏感な人は、車の運転や、危険を伴う機械の操作には気をつけてください。
- ・セイヨウオトギリソウを含有する食品はこの薬に影響しますので、控えてください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

副作用として、発疹、蕁麻疹、紫斑、浮腫などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・脈が乱れる、食欲不振、嘔吐、視覚異常、錯乱 [ジギタリス中毒]
- ・激しい腹痛、血便 [非閉塞性腸間膜虚血]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。