

くすりのしおり

内服剤

2019年01月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：フルツロンカプセル 200

主成分：ドキシフルリジン(Doxifluridine)

剤形：淡赤白色/白色のカプセル剤

シート記載：フルツロン 200mg



この薬の作用と効果について

がん細胞遺伝子の合成や機能を阻害することにより、がん細胞の増殖を抑える作用があります。

通常、胃がん、結腸・直腸がん、乳がん、子宮頸がん、膀胱がんの治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤を使用中止後7日以内、骨髄機能抑制、腎障害、肝障害、感染症、心疾患または以前に心疾患にかかったことがある、消化管潰瘍または消化管出血、水痘
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、1日4～6カプセル（主成分として800～1,200mg）を3～4回に分けて服用しますが、年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、飲み忘れた分はとばして次回から指示通り飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、下痢、食欲不振、発疹、湿疹、蕁麻疹などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・のどが渇く、尿の量が減る、体や足がむくむ、目のはれ、だるい、疲れやすい [脱水症状、急性腎不全]
- ・かぜのような症状、鼻血などが止まりにくい、あざが消えない、疲れやすい [骨髄機能抑制、溶血性貧血]
- ・激しい腹痛、血便、吐き気、嘔吐、腹がはる [重篤な腸炎（出血性腸炎、虚血性腸炎、壊死性腸炎など）]
- ・歩行時のふらつき、意識の低下、口のもつれ、動作が遅くなる [重篤な精神神経障害（白質脳症など）]
- ・発熱、から咳、息切れ、息苦しい [間質性肺炎]
- ・皮膚や白目が黄色くなる、からだのだるい、食欲不振、かゆみ [肝障害、黄疸]
- ・ひどくおなかが痛い、背中や腰が痛い、発熱、吐き気、おう吐、食欲低下 [急性膵炎]
- ・においがわからなくなる [嗅覚脱失]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・直射日光と湿気を避けて、子どもの手の届かないところに室温（1～30℃）で保存してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局や医療機関に相談してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。