

くすりのしおり

注射剤

2019年06月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力がが必要です。

商品名：グリセオール注（200mL）

主成分：濃グリセリン (Glycerin)
果糖 (Fructose)

剤形：注射剤

シート記載：



この薬の作用と効果について

脳のむくみ（脳浮腫）をとって、脳圧（頭蓋内圧）を下げます。眼内圧を下げる作用もあります。通常、頭蓋内圧下降、頭蓋内圧浮腫の改善、脳外科手術後の後療法、眼内圧下降、脳外科・眼科手術時に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。先天性のグリセリン、果糖代謝異常症、成人発症 II 型シトルリン血症、心臓や循環器官の機能に障害がある。腎障害、尿崩症、糖尿病、食塩の摂取制限を受けている。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・頭蓋内圧下降、頭蓋内圧浮腫の改善、脳外科手術後の後療法：通常、成人は 1 日 1～2 回、点滴します。効果をみながら使用量、使用間隔を決めていきます。
- ・脳外科手術時：通常、1 回 30 分かけて点滴します。
- ・眼内圧下降、眼手術時：通常、1 回 45～90 分かけて点滴します。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

副作用として、血色素尿、血尿、尿意、悪心、頭痛、口渇などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・吐き気、おう吐、腹痛、息苦しい、呼吸の数が增える、体に力が入らない、ふるえ、意識が無くなる [アシドーシス]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。